

Póster n° 2.111: Síndrome doloroso regional complejo (S.D.R.C) tipos 1 y 2: Reporte de pacientes

Autores: Presinky, Marcelo. Craviotto, Diego. Nannini, Fernando.

Institución: Hospital Lagomaggiore, Mendoza, Argentina.

Asociación Mendocina de Anestesiología (AMA)

Tipo 1:

Sin identificación de lesión nerviosa

1. Diagnóstico



2. Post Bloqueo caudal



3. Post Bloqueo simpático lumbar



Tabla 32.2. Criterios diagnósticos de síndrome de dolor regional complejo (SDRC) de la IASP (criterios de Budapest)

- Dolor** continuo, desproporcionado para el evento que lo pudo provocar.
- Síntomas** (debe cumplir un mínimo de un síntoma de tres de las cuatro categorías):
 - Sensorial: hiperestesia y/o alodinia.
 - Vasomotor: asimetría de la temperatura cutánea y/o asimetría del color cutáneo y/o cambios de color cutáneo.
 - Sudomotor: edema y/o cambios de sudoración y/o sudoración asimétrica.
 - Motor: disminución del rango de movilidad y/o disfunción motora (temblor, distonía, debilidad) y/o cambios tróficos (en la piel, el vello, las uñas).
- Signos** (debe cumplir un mínimo de un signo en dos o más de las cuatro categorías):
 - Sensorial: evidencia de hiperalgesia (a la punción) y/alodinia (al tacto/térmica/presión profunda/movimiento articular).
 - Vasomotor: evidencia de asimetría de la temperatura cutánea > 1°C y/o asimetría del color cutáneo y/o cambios de color cutáneo.
 - Sudomotor: evidencia de edema y/o cambios de sudoración y/o sudoración asimétrica.
 - Motor: evidencia de disminución del rango de movilidad y/o disfunción motora (temblor, distonía, debilidad) y/o cambios tróficos (en la piel, el vello, las uñas).
- Descartar otras patologías** que puedan explicar los síntomas y signos previos.

Tipo 2:

Con identificación de lesión nerviosa

1. Diagnóstico



Evolución 96h pop

3



Evolución a los 15 días

5




2. RMN Lumbar



Histopatología de Biopsia Cutánea

4



6

